

تطابق اندازه‌های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی

دکتر نازنین فرشچیان^{۱*}، دکتر محمد غریب صالحی^۲، دکتر نسیم رسیدی^۳،

پریسا بهرامی کمانگر^۴

۱. دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
۲. استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
۳. دستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
۴. پژوهشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

خلاصه

مقدمه: در انسان، رشد مخچه ممکن است کمترین تأثیر را از تأخیر رشد داخل رحمی (IUGR) بپذیرد، بنابراین اندازه‌گیری دیامتر عرضی مخچه می‌تواند به عنوان معیار اندازه‌گیری مناسب جهت تعیین سن حاملگی جنین‌های مبتلا به IUGR استفاده شود. مطالعه حاضر با هدف نقش اندازه‌گیری TCD در تعیین سن جنین‌های با تأخیر رشد داخل رحمی انجام شد.

روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۵ بر روی ۳۵ زن باردار دارای شکم کوچک و با احتمال جنین مبتلا به IUGR مراجعه کننده به بخش سونوگرافی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد. ابتدا سن حاملگی آنها بر اساس آخرین قاعده‌گی (LMP) مشخص و سپس بیمار سونوگرافی شده و سن حاملگی نیز بر اساس اندازه‌گیری قطر عرضی مخچه (TCD) و سایر پارامترهای روتین سونوگرافی مشخص و در پایان نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۲) و آزمون‌های تی زوجی، ویلکاکسون، ضربی همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بین سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر TCD با سن حاملگی بر اساس LMP تفاوت معناداری وجود نداشت ($p > 0/05$)، اما سن حاملگی برآورده شده توسط پارامترهای قطر عرضی دو آهیانه (BPD) و طول استخوان ران (FL) به طور معناداری کمتر از سن حاملگی بر اساس LMP بود ($p < 0/05$). همچنان، سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر TCD به طور معناداری بیشتر از سن حاملگی بر اساس پارامترهای BPD و FL بود ($p < 0/05$).

نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از پارامتر دیامتر عرضی مخچه (TCD) در برآورد سن دقیق جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی می‌تواند مطمئن و قابل استناد باشد.

کلمات کلیدی: تأخیر رشد داخل رحمی، دیامتر عرضی مخچه، سن حاملگی، سونوگرافی

* نویسنده مسئول مکاتبات: دکتر نازنین فرشچیان؛ دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. تلفن: ۰۸۳-۳۴۲۷۶۳۱۰؛ پست الکترونیک: Nfarshchian@kums.ac.ir

مقدمه

جنین‌هایی که اختلالات ژنتیکی دارند، برای کمک به مراقبت مناسب جنین مفید خواهد بود. تعیین سن دقیق حاملگی خصوصاً در سه ماهه سوم بارداری در تصمیم‌گیری جهت مداخله اختصاصی بالینی از قبیل ختم حاملگی و یا درمان‌های دیگر بسیار مهم است (۶). دیامتر عرضی مخچه (TCD)^۶ از پارامترهای جنینی است که به عنوان یک شاخص پیش‌بینی قابل اعتماد از سن حاملگی جنین به کار می‌رود و در حقیقت یک استاندارد مقایسه‌ای در مورد سایر پارامترهای جنین نیز محسوب می‌شود. TCD در پیش‌بینی سن حاملگی در حاملگی‌های تک‌قلو و دوقلو نقش مهمی دارد (۷). از طرفی TCD یکی از پارامترهای برآورده سن حاملگی است که جدیداً در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجایی که مخچه تحت تأثیر اختلال رشد قرار نمی‌گیرد، در موارد شک به IUGR تخمین سن حاملگی بر اساس TCD پیشگویی قابل اعتمادتری نسبت به سایر پارامترها می‌باشد (۸). بنابراین تعیین سن حاملگی سونوگرافیک بر اساس جثه جنین و ارتباط بین پارامترهای ذکر شده در جنین بوده و اگر جنینی مبتلا به IUGR باشد، این پارامترها هم کمتر محاسبه می‌شوند و در نتیجه به متفاوت بودن پارامترهای سونوگرافیک تعیین سن حاملگی، در نزادهای مختلف و عدم انجام مطالعه مشابه در نزاد ایرانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تطابق پارامترهای بیومتریک مختلف نظری دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین‌های ایرانی مبتلا به IUGR و مقایسه بین آنها انجام شد تا شاید بتوان با استفاده از این مطالعه، روش دقیق‌تری در تعیین سن حاملگی این جنین‌ها در کنار سایر روش‌های بی‌خطر سونوگرافی در تعیین سن حاملگی به دست آورد.

روش کار

این مطالعه مقطعی بهروش تحلیل همبستگی و با روش نمونه‌گیری در دسترس، در سال ۱۳۹۵ بر روی ۳۵ زن باردار که در معاینه به عمل آمده توسط متخصص زنان،

یکی از مفیدترین کاربردهای سونوگرافی، تعیین سن حاملگی می‌باشد که دقیق‌ترین زمان آن در سه ماهه اول بارداری بوده و در زمان حال نقش جدایی‌ناپذیری در مراقبت‌های دوران بارداری دارد. تعیین دقیق تاریخ حاملگی و استفاده از سونوگرافی، نقش مهمی در بهبود ارزیابی رشد و نمو جنین، تشخیص عقب ماندگی رشد داخل رحمی و تشخیص پیش از تولد انواعی از ناهنجاری‌های مادرزادی دارد (۱). تعیین سن حاملگی به‌وسیله سونوگرافی با استفاده از پارامترهای بیومتریک جنین نظری: قطر عرضی دو آهیانه، اندازه دور سر (HC)^۱، اندازه دور شکم (AC)^۲ و طول استخوان ران صورت می‌گیرد، اما متأسفانه در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی (IUGR)^۳ که دارای جثه کوچک‌تر هستند، تمامی این پارامترها تحت تأثیر قرار گرفته و کوچک‌تر می‌شوند، لذا استفاده از آنها با تخمین سن حاملگی کمتر از سن واقعی همراهی دارد (۲). عقب‌ماندگی رشد درون رحمی جنین، یک عامل مهم مرگ‌ومیر جنین قبل از تولد است. IUGR اغلب توسط آسیفکسی^۴ یا کاهش جریان خون جفتی-رحمی ایجاد می‌شود. در آسیفکسی حاد، جریان خون مخچه‌ای بدون تغییر مانده که پیامدی از توزیع مجدد برون‌ده قلبی است. اندازه‌گیری دیامتر عرضی مخچه می‌تواند به عنوان یک معیار اندازه‌گیری بی‌سو^۵ جهت تعیین سن حاملگی جنین مورد استفاده قرار گیرد (۳). تشخیص اولیه جنین مبتلا به IUGR یک مؤلفه ضروری در کنترل پیامدهای مختلف ناشی از آن است و این تشخیص با ارزیابی سن حاملگی شروع می‌شود (۴، ۵). تولد پیش از موعد، یکی از علل عمده مرگ‌ومیر و عوارض در نوزادان است و در طی دهه‌های گذشته افزایش قابل توجهی در میزان زنده ماندن شیرخواران با وزن تولد بسیار پایین رخ داده است. بنابراین، شناخت نحوه رشد نابهنهنجار و اختلال در رشد در طیف زمانی سن حاملگی هم در جنین سالم و هم

¹ Head Circumference

² Abdominal Circumference

³ Intra uterine growth retardation

⁴ Asphyxia

⁵ Unbiased

⁶ Transcerebellar diameter

مشخص در جنین بود. این مادران پس از کسب رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدند. با توجه به این که یکی از معیارهای ورود به مطالعه، قابل اعتماد بودن LMP مادر بود، لذا سن حاملگی بر اساس LMP بیمار و در صورت لزوم مقایسه با سونوگرافی سه ماهه اول بارداری توسط دستیار همکار طرح به دقت تعیین شد، سپس توسط مجری طرح که از LMP بیماران مطلع نبود، با استفاده از دستگاه سونوگرافی مدیسون مدل Accuvix A30، FL، BPD و TCD تعیین و ثبت شد (شکل ۱). تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS (نسخه ۲۲) و آزمون‌های تی زوجی، ویلکاکسون، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد.



شکل ۱- نحوه اندازه‌گیری TCD

مقایسه تخمین سن حاملگی بر اساس پارامترهای روتین سونوگرافی (FL، BPD و TCD) با سن حاملگی واقعی بر اساس LMP در جدول ۱ خلاصه شده است.

یافته‌ها

در این مطالعه سن بیماران بین ۱۶-۴۳ سال با میانگین $30/26 \pm 7/22$ سال بود. گروایتی ۱۹ نفر ($54/3\%$) نفر ($25/7\%$) ۲ و ۷ نفر ($20/2\%$) ۳ بود. پاریتی ۲۱ نفر ($60/2\%$) صفر، ۱۰ نفر ($28/6\%$) ۱ و ۴ نفر ($11/4\%$) ۲ بود. وزن جنین‌ها بین ۵۰۰-۲۴۰۰ گرم با میانگین

جدول ۱- ویژگی‌های توصیفی سن بارداری زنان باردار بر اساس پارامترهای روتین سونوگرافی

پارامتر	کمترین	میانگین	انحراف معیار	بیشترین
LMP	۴۰	۳۴/۳۴	۲/۸۵	۲۵
TCD	۴۰	۳۴/۱۲	۲/۹۶	۲۵
FL	۳۵	۳۰/۳۷	۲/۹۹	۲۰
BPD	۴۰	۳۲/۶	۲/۷۵	۲۴

آزمون ضریب همبستگی پیرسون

حاصله ضریب همبستگی بین این دو پارامتر در تعیین سن حاملگی از نظر آماری معنادار بود ($p=0.004$). همچنین برای مقایسه سن حاملگی بر اساس TCD و FL در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید که بر اساس نتایج این آزمون‌ها، بین تعیین سن حاملگی جنین‌های مبتلا به اختلال سن حاملگی دو روش TCD و FL همبستگی معناداری داشتند ($p<0.001$). ویژگی‌های توصیفی و مقایسه سن حاملگی بر اساس TCD و BPD و همچنین FL و TCD در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی در جدول ۲ خلاصه شده است.

جدول ۲- ویژگی‌های توصیفی و مقایسه سن حاملگی بر اساس TCD و BPD و همچنین FL در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی

آماره آزمون	سطح معنی‌داری	برآورد سن حاملگی		
		BPD	TCD	BPD و TCD (میانگین \pm انحراف معیار)
* 0.004	۳/۰۶	۳۲/۶۶ \pm ۳/۷۵	۳۴/۱۲ \pm ۳/۹۶	۳۴/۱۲ \pm ۳/۹۶ (میانگین \pm انحراف معیار)
** <0.001	۵/۰۵	۳۰/۳۷ \pm ۳/۹۹	۳۴/۱۲ \pm ۳/۹۶	۳۴/۱۲ \pm ۳/۹۶ (میانگین \pm انحراف معیار)

* ضریب همبستگی پیرسون، ** ضریب همبستگی اسپیرمن

میزان تطابق قطر بین دو آهیانه با سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی بهوسیله روش سونوگرافی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید ($p<0.001$). بنابراین بر اساس این آزمون‌ها، بین سن حاملگی با دیامتر عرضی مخچه جنین، طول استخوان ران جنین و دیامتر بین دو استخوان آهیانه جنین همبستگی معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی و تعیین میزان تطابق دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه با سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی بهوسیله روش سونوگرافی در جدول ۳ خلاصه شده است.

بر اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول ۱، بین سن حاملگی بر اساس TCD با سن حاملگی بر اساس LMP تفاوت معناداری وجود نداشت ($p>0.05$). همچنین بین سن حاملگی بر اساس FL با سن حاملگی بر اساس LMP تفاوت معناداری وجود داشت ($p<0.05$). بین سن حاملگی بر اساس BPD با سن حاملگی بر اساس LMP تفاوت معناداری وجود داشت ($p<0.05$).

بهمنظور مقایسه سن حاملگی بر اساس TCD و BPD در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. بر اساس نتایج

بر اساس نتایج آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در جدول ۲، بین سن حاملگی بر اساس TCD و BPD و همچنین FL در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی، تفاوت معناداری وجود داشت ($p<0.05$).

بهمنظور بررسی میزان تطابق دیامتر عرضی مخچه با سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی بهوسیله روش سونوگرافی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید ($p<0.001$). بهمنظور بررسی میزان تطابق طول استخوان ران با سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی بهوسیله روش سونوگرافی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید ($p<0.001$). همچنین بهمنظور بررسی

جدول ۳- مقدار ضریب همبستگی و تعیین میزان تطابق دیامتر عرضی مخچه طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه با سن حاملگی جنین های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی با روش سونوگرافی

LMP	متغیر	ضریب همبستگی	سطح معنی داری
	TCD	۰/۹۷۶	<۰/۰۰۱
	FL	۰/۹۱	<۰/۰۰۱
	BPD	۰/۹۲۷	<۰/۰۰۱

جنین های مبتلا به IUGR در سه ماهه دوم بارداری برابر ۰/۹۷ و در سه ماهه سوم بارداری برابر ۰/۹۳ بود، بنابراین نتیجه گرفته اند TCD یک پارامتر بیومتری قابل اطمینان و دقیق سونوگرافی برای پیش بینی سن حاملگی در جنین های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی است (۷) که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت. در مطالعه افشار و همکاران (۲۰۱۴) همخوان با مطالعه حاضر، بین میانگین سن حاملگی بر اساس TCD در جنین های مبتلا به IUGR و سالم تفاوتی وجود نداشت و نتیجه گرفته اند از اندازه گیری TCD می تواند برای برآورد دقیق سن حاملگی جنین های مبتلا به IUGR استفاده شود (۱۲). مطالعه بانسال و همکاران (۲۰۱۴) نشان داد که TCD همارز با سن حاملگی جنین های سالم و مبتلا به IUGR است؛ به طوری که ضریب همبستگی بین سن حاملگی و TCD برابر ۰/۹۷۲ بود و در جنین های سالم و مبتلا به IUGR، پارامتر TCD با رشد سن حاملگی افزایش می یافتد (۸) که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت. بهیماران و همکاران (۲۰۱۵) همسو با مطالعه حاضر، ارتباط خطی TCD با LMP در جنین های مبتلا به IUGR را گزارش نمودند (۱۳). در مطالعه علی و همکاران (۲۰۱۴) همسو با مطالعه حاضر، تفاوت معناداری بین سن حاملگی برآورد شده بر اساس TCD در جنین های مبتلا به IUGR و سالم وجود نداشت. بنابراین، پارامتر TCD می تواند در تعیین سن حاملگی جنین های مبتلا به IUGR کمک کننده باشد (۱۴). در مطالعه شارما و همکاران (۲۰۱۴) نیز همسو با مطالعه حاضر، از میان همه پارامترهای برآورد کننده سن حاملگی در ۱۰۰ جنین سالم و ۵۲ جنین مبتلا به IUGR، تنها سن حاملگی برآورد شده توسط TCD دقیق و نزدیک به سن حاملگی واقعی بود و برآورد سن

بر اساس نتایج جدول ۳، بین دیامتر عرضی مخچه با سن حاملگی جنین های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی به وسیله روش سونوگرافی تطابق معناداری وجود داشت ($p < 0.05$). بین طول استخوان ران با سن حاملگی جنین های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی به وسیله روش سونوگرافی تطابق معناداری وجود داشت ($p < 0.05$). همچنان بین قطر بین دو آهیانه با سن حاملگی جنین های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی به وسیله روش سونوگرافی تطابق معناداری وجود داشت ($p < 0.05$).

بحث

اندازه گیری پارامترهای سونوگرافی جنین به منظور تعیین دقیق سن حاملگی و تعیین اختلالات رشد جنین انجام می گیرد. انتخاب مفیدترین پارامتر بیومتریک به زمان و هدف اندازه گیری وابسته است و با محدودیت های خاصی تحت تأثیر قرار می گیرد (۹). از آنجا که برآورد دقیق سن حاملگی از لحاظ مراقبت های بارداری و زایمان لازم و ضروری است و تخمین سن حاملگی به وسیله پارامترهای سونوگرافی و مختلفی از قبیل TCD، FL، AC، HC، BPD و مسیری دیگر از اندازه های ابعاد جنین انجام می شود و از طرفی سونوگرافی در معرض خطر خطای مشاهده گر است و شاخص های جنینی، روش های مختلف اندازه گیری و مشکلات موضعی ممکن است دقت تخمین سن حاملگی را کاهش دهند (۱۰)، لذا مسئله انتخاب پارامتر سونوگرافی مناسب برای تخمین دقیق سن حاملگی، محققین را به بررسی و ارزیابی پارامترهای رایج سونوگرافی و پیشنهاد پارامترهای جدید و اداسته است (۱۱). در مطالعه چاوز و همکاران (۲۰۰۷)، ضریب همبستگی بین TCD با LMP در

دارد (۲۳). علاوه بر این، نتیجه مطالعه حاضر با نتایج بسیاری از مطالعات در اطراف جهان سازگاری دارد و حمایت می‌شود (۲۴). این مطالعات استفاده از TCD را به عنوان یک روش مطمئن برای ارزیابی سن حاملگی و شناسایی جنین‌های مبتلا به IUGR در زمان مناسب برای مدیریت عوارض مرتبط با حاملگی‌های مختلف توصیف می‌کنند (۲۵) و اندازه‌گیری قطر عرضی مخچه TCD به وسیله سونوگرافی، یک پارامتر ارزشمند برای ارزیابی سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی می‌باشد (۲۶). در نهایت بر اساس نتایج مطالعه حاضر به‌نظر می‌رسد که TCD می‌تواند به یک پارامتر بیومتریک سونوگرافیک مهم در جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی نامتقارن برای پیش‌بینی سن حاملگی استفاده شود و پیشنهاد می‌گردد TCD به عنوان یک پارامتر مهم در ارزیابی سن حاملگی برای مدیریت به موقع عوارض مختلف طی حاملگی با تأخیر رشد داخل رحمی نامتقارن به کار گرفته شود. همچنین با توجه به ارتباط قوی بین دیامتر TCD با سن بارداری و دسترسی آسان به این شاخص و اندازه‌گیری آن در نیمه دوم بارداری، می‌توان از دیامتر TCD به عنوان یک معیار جدید در تعیین سن TCD بارداری جنین بهره برد. با نظر به اینکه دیامتر شاخص مناسب برای تعیین سن حاملگی است، می‌توان در هنگام مواجه با مشکل در تعیین دقیق سن جنین در اواخر بارداری، مانند مواردی که مادر LMP خود را فراموش کرده و سونوگرافی اوایل بارداری در دسترس نیست و یا در مواردی که برای حفظ سلامتی مادر و جنین ختم فوری حاملگی ضرورت می‌یابد، اما از ترم بودن جنین اطمینان وجود ندارد، از معیار TCD برای شناسایی جنین‌های بالغ استفاده نمود. بر اساس مهم‌ترین نتایج این مطالعه، بین تخمین سن حاملگی جنین‌های با تأخیر رشد داخل رحمی نامتقارن در زنان باردار بر اساس پارامترهای روتین سونوگرافی (BPD، FL و TCD) با LMP ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد. البته، مقدار ضریب همبستگی پارامتر TCD بیشتر از دو پارامتر BPD و FL بود؛ به طوری که سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر

حاملگی توسط پارامترهای HC، BPD و FL بیش از ۳ هفته اختلاف با سن حاملگی واقعی داشت (۱۵). در مطالعه پراساد و همکاران (۲۰۱۴) در بررسی ۲۰ جنین مبتلا به IUGR، ۸۵٪ اندازه‌گیری‌های TCD در محدوده نرمال قرار داشتند، در حالی که ۱۰٪ اندازه‌گیری‌های BPD و FL در محدوده نرمال قرار داشتند (۱۶) که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت. والفسون و همکاران (۱۹۸۳) نشان دادند که پارامتر BPD در جنین‌هایی که دچار پارگی زودرس غشاء شده‌اند، قابل اعتماد نیست (۱۷). بات و همکاران (۲۰۱۴) با استفاده از دستورالعمل‌های مبتنی بر شواهد، مطالعات چاپ شده درباره برآورد سن حاملگی تا سال ۲۰۱۳ را بررسی و به این نتیجه رسیدند که در تعیین سن حاملگی در سه ماهه دوم یا سوم بارداری با استفاده از سونوگرافی، می‌بایست از ترکیب پارامترهای چندگانه (AC، HC، BPD و FL) بهجای یک پارامتر تکی استفاده نمود (۱۸). در مطالعه فرشچیان و همکاران (۲۰۰۷) مشابه مطالعه حاضر، ضریب همبستگی بین سن حاملگی و TCD برابر ۰/۸۸ بود و به‌نظر می‌رسد پارامتر TCD از دقت بیشتری نسبت به پارامتر برخوردار است (۱۹). در مطالعه دیگر فرشچیان و همکاران (۲۰۱۴) مشابه مطالعه حاضر، ضریب همبستگی بین سن حاملگی و TCD برابر ۰/۹۷۷ بود (۲۰). نتایج مطالعه حاضر می‌توانند این حقیقت را بیان کنند که پارامتر TCD در میان جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی نامتقارن تأثیر نمی‌پذیرد. بنابراین، در تعیین سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی کمک‌کننده باشد. فرضیه "رشد مخچه انسان نسبتاً با هایپوكسمی مزمن مقاومت می‌کند" با توجه به نتایج مطالعه حاضر حمایت می‌شود (۲۱). این فرآیند یک مکانیسم خاص در مراقبت از رشد مخچه است و مخچه نیز به دلیل تراکم اطراف برآمدگی‌های پتروس، مسئول تغییر دادن شکل و اندازه نیست و استخوان اکسیپیتال با سایر ساختارهای مغز مقایسه می‌شود (۲۲). این نتیجه با نتایج مطالعاتی که آشکار می‌سازد جریان خون به مخچه، ساقه مغز و مغز میانی در مقایسه با مغز پیشین بالاتر است، سازگاری

نتیجه‌گیری

بهره‌گیری از پارامتر دیامتر عرضی مخچه (TCD) در برآورده سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخلی رحمی در کنار سایر پارامترهای روتین برآورده سن حاملگی می‌تواند مطمئن و قابل استناد باشد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه حاصل پایان‌نامه خاتم دکتر نسیم رشیدی با کد ۹۴۴۶۳ می‌باشد. بدین‌وسیله از همکاری واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع) کرمانشاه که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند، تشکر و قدردانی می‌شود.

TCD با سن حاملگی واقعی تفاوت معناداری نداشت، اما سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر BPD و FL به طور معناداری کمتر از سن حاملگی واقعی بود. همچنین، سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر TCD به طور معناداری بیشتر از سن حاملگی برآورده شده توسط پارامترهای BPD و FL بود. بنابراین، به نظر می‌رسد که پارامتر TCD به طور قابل توجهی دقیق‌تر از سایر پارامترهای BPD و FL سن حاملگی جنین‌های با تأخیر رشد داخلی رحمی را برآورد می‌کند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می‌شود که مطالعه مشابه با حجم نمونه بیشتر از نظر ارائه آمار دقیق‌تر انجام شود.

منابع

1. Kalish RB, Chervenak FA. Sonographic determination of gestational age. *Ultrasound Rev Obstet Gynecol* 2005; 5(4):254-8.
2. Chawanpaiboon S, Kanokpongjakdi S, Vantanasisri C. Predicting fetal intrauterine growth retardation by using reference centile charts for the ratio of fetal transverse cerebellar diameter to abdominal circumference in a Thai population. *Siriraj Med J* 2008; 60(6):316-9.
3. Larroche JC. The development of the central nervous system during intrauterine life, Part II. In: Falkner F, editor. *Human Development*. Philadelphia: Saunders; 1966. P. 257-76.
4. Mcleary RD, Kuhns LR, Barr Jr M. Ultrasonography of the fetal cerebellum. *Radiology* 1984; 151(2):439-42.
5. Lee W, Barton S, Comstock CH, Bajorek S, Batton D, Kirk JS. Transverse cerebellar diameter: a useful predictor of gestational age for fetuses with asymmetric growth retardation. *Am J Obstet Gynecol* 1991; 165(4 Pt 1):1044-50.
6. Bettelheim D, Deutinger J, Bernaschek G. *Fetal sonographic biometry: a guide to normal and abnormal measurements*. Nashville: Parthenon Publishing; 1997. P. 32-5.
7. Chavez MR, Ananth CV, Smulian JC, Vintzileos AM. Fetal transcerebellar diameter measurement for prediction of gestational age at the extremes of fetal growth. *J Ultrasound Med* 2007; 26(9):1167-71.
8. Bansal M, Bansal A, Jain S, Khare S, Ghai R. A study of correlation of transverse cerebellar diameter with gestational age in the normal & growth restricted fetuses in Western Uttar Pradesh. *Peop J Sci Res* 2014; 7(2):16-21.
9. Degani S. Fetal biometry: clinical, pathological, and technical considerations. *Obstet Gynecol Surv* 2001; 56(3):159-67.
10. Malhotra N, Kumar P. *Ultrasound in obstetrics and gynaecology*. 3rd ed. Mumbai: Jaypee Brothers Medical Publishers Private Ltd; 1999. P. 92-8, 198-200, 386-8.
11. Vinals F, Munoz M, Naveas R, Shlper J, Giuliano A. The fetal cerebellar vermis: anatomy and biometric assessment using volums contrast imaging in the C-plane (VCI-C). *Ultrasound Obstet Gynecol* 2009; 26(6):622-7.
12. Afshan A, Nadeem S, Shamim Asim S. Fetal transverse cerebellar diameter measurement; a useful predictor of gestational age in growth restricted fetuses. *Profess Med J* 2014; 21(5):881-91.
13. Bhimarao RM, Bhat V, Gowda PV. Efficacy of transcerebellar diameter/abdominal circumference versus head circumference/abdominal circumference in predicting asymmetric intrauterine growth retardation. *J Clin Diagn Res* 2015; 9(10):TC01-5.
14. Ali SA, Khuwaja AB. Comparison of transcerebellar diameter in growth restricted and normal singleton fetuses for the assessment of gestational age: a case control study. *Elective Med J* 2014; 2(3):200-4.
15. Sharma C, Bhardwaj A, Sharma Lines KS. Fetal transcerebellar diameter measurement for prediction of gestational age: a more dependable parameter even in IUGR. *Int J Gynae Plastic Surg* 2014; 6(1):13-8.
16. Prasad SB, Likhitha S. Cerebellar measurements with ultrasonography in the evaluation of fetal age. *IOSR-JDMS* 2014; 13(9):49-56.
17. Wolfson RN, Zador IE, Havorsen P, Andrews B, Sokol RJ. Biparietal diameter in premature rupture of membranes: errors in estimating gestational age. *J Clin Ultrasound* 1983; 11(7):371-4.

18. Butt K, LimK; Diagnostic Imaging Committee. Determination of gestational age by ultrasound. *J Obstet Gynaecol Can* 2014; 36(2):171-81.
19. Farshchian N, Iranfar S, Rezaie M. Estimation of gestational age using ultrasound scan. *J Kermanshah Univ Med Sci* 2007; 11(1):11-8. (Persian).
20. Farshchian N, Fakheri T, Rezaei M, Ebrahimi HR. Comparison of diagnostic value of fetal cerebellar hemisphere circumference measurement and routine ultrasonography parameters for determination of the gestational age. *Sci J Kurdistan Univ Med Sci* 2014; 19(1):51-7. (Persian).
21. Holanda-Filho JA, Souza AI, Souza AS, Figueiroa JN, Ferreira AL, Cabral-Filho JE. Fetal transverse cerebellar diameter measured by ultrasound does not differ between genders. *Arch Gynecol Obstet* 2010; 284(2):299-302.
22. Kuklisova-Murgasova M, Aljabar P, Srinivasan L, Counsell SJ, Doria V, Serag A, et al. A dynamic 4D probabilistic atlas of the developing brain. *Neuroimage* 2011; 54(4):2750-63.
23. Campbell WA, Vintzileos AM, Rodis JF, Turner GW, Egan JF, Nardi DA. Use of the transverse cerebellar diameter/abdominal circumference ratio in pregnancies at risk for intrauterine growth retardation. *J Clin Ultrasound* 1994; 22(8):497-502.
24. Singhakom N, Chawanpaiboon S, Titapant V. Reference centile charts for ratio of fetal transverse cerebellar diameter to abdominal circumference in a Thai population. *J Med Assoc Thai* 2004; 87(Suppl 3):S54-8.
25. Ravindernath ML, Reddy M, Reddy N. Accuracy of transverse cerebellar diameter measurement by ultrasonography in the evaluation of foetal age. *Int J Adv Med* 201; 4(3):836-41.
26. Tabatabaei S, Ehsan M, Fahimi F. Relationship between gestational age and embryonic cerebellum diameter in patients referred to Bahonar hospital for routine ultrasonography of pregnancy in the years 2002-2003. [Master Thesis]. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences; 2003. (Persian).

