

بررسی میزان صدمات پرینه در مادران نخست زا با اپیزیاتومی رایج و انتخابی

نویسنده‌گان:

*نامید گلمکانی

کارشناسی ارشد مامائی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی مشهد

شهلا رفائل سعیدی

کارشناس ارشد مامائی

سید رضا مظلوم

کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامائی مشهد

بدیع سلطانی

متخصص زنان و زایمان

تاریخ پذیرش: ۸۵/۷/۱۲

تاریخ ارائه: ۸۶/۷/۱۲

Evaluation of the Prineal Trauma Level in Primiparous Women with Routine and Selective Episiotomy

Abstract

Introduction: Episiotomy and perineal lacerations are common perineal traumas during the primiparous vaginal birth and is the most common operation in obstetrics. There is no reliable evidence for routine use of episiotomy and it is recommended to perform selective episiotomy for fetal maternal indications. Therefore for this study was performed by the objective, comparison of perineal traumas level in primiparous women with routine and selective episiotomy.

Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out in 2003 on 100 primiparous women, between 17-35 years old with spontaneous delivery, at Modarres hospital in Kashmar. Sampling accomplished by purposeful method. They randomly allocated in two groups with routine and selective episiotomy. Delivery of subjects done by the researcher, but evaluation of perineal outcome, after delivery completed by the assistant researcher, who did not know about the group of samples. Trial allocation data obtained by interviewing, observation forms, measurement of pelvic muscle strength and were analyzed with t-test, chi-square, Mann Whitney and Fisher test, using SPSS software.

Results: Of 100 women studied, 12(24%) in selective group and 50(100%) in routine group had episiotomy ($p<0/0001$). Perineal traumas in selective, routine groups were 62% and 100% respectively. These findings varied statistically ($p<0/0001$). In this study, two groups did not differ statistically regarding the effectiveness of variables on perineal traumas.

Conclusion: Selective episiotomy can reduce the perineal traumas Level, thus as a safe method, should replace the routine episiotomy.

Keyword: Routine episiotomy, Selective episiotomy, Perineal trauma, Primiparous

آدرس:

مشهد، دانشکده پرستاری و مامائی

تلفن: ۰۵۱۱-۸۵۹۱۵۱۱ - ۰۵۱۱-۸۵۹۷۳۱۳

نفابر: Nahid_Golmakan@yahoo.com

مقدمه

بروزپارگیهای اسفنکتر مقدع و یا رکتوم (و یا هر دو) همراه است، در مقابل در صورتی که اپی زیاتومی انجام نشود، شیوع پارگیهای قدامی پرینه که به پیشابرای ولبهای ولو گسترش می یابد، افزایش پیدا می کند^(۵). گروه محققان آرژانتین (۱۹۹۳) شیوع پارگیهای قدامی پرینه را در گروه با اپی زیاتومی محدود ۱۹/۲ درصد و در گروه با اپی زیاتومی رایج ۸/۱ درصد بیان کردند که حاکی از کاهش قابل توجه صدمات وارد بر نواحی قدامی پرینه به دنبال اپی زیاتومی می باشد^(۶).

اپی زیاتومی نیز مثل هر برش جراحی دیگر خطراتی در بر دارد که شامل درد، خونریزی، عفونت، آبسه، هماتوم، صدمه به اسفنکتر مقدع و مخاط مقدع، فسیتوول بین مقدع و مهبل و مقاربیت دردناک می باشد^(۷). دنفورث^(۸) (۲۰۰۳) بیان می کند اپی زیاتومی خطرترومای پرینه خلفی را افزایش می دهد^(۱۱). سیگنورلو^۷ و همکاران^(۱) (۲۰۰۱) بیان کردند، بی اختیاری مدفوع و دفع گازدر خانمهای که اپی زیاتومی شده‌اند، در مقایسه با آنهایی که اپی زیاتومی نشده‌اند، به میزان چهار تا شش برابر افزایش نشان می دهد^(۲). نتایج مطالعه‌ای که در آرژانتین (۱۹۹۶) با هدف مقایسه اپی زیاتومی رایج و انتخابی بر ۲۶۰۹ زایمان انجام شد، نشان داد که در موارد انجام اپی زیاتومی به صورت انتخابی صدمات خلفی پرینه، درد پرینه، نیازبه ترمیم و عوارض دوران ترمیم به میزان قابل توجهی نسبت به انجام اپی زیاتومی به صورت رایج کاهش داشته است^(۳).

بنابراین با توجه به مشکلاتی که به دنبال اپی زیاتومی و صدمات وارد بر پرینه ایجاد می شود و عنایت به اینکه سازمان بهداشت جهانی نیز طرح مراقبت با حداقل مداخله را در مراحل زایمان طبیعی ارائه و توصیه کرده است، اعمال و روشهای مداخله گرانه‌ای مثل آمنیوتومی و اپی زیاتومی تا حد امکان کمتر استفاده شود و میزان ۱۰ درصد اپی زیاتومی را

اپی زیاتومی^(۱) به معنای برش ناحیه پرینه است، این عمل رایج‌ترین جراحی در مامائی بعد از بریدن بندناف است^(۲,۱). شیوع اپی زیاتومی در کشورهای مختلف متفاوت است. شیونو^۲ و همکاران (۱۹۹۰) در امریکا شیوع اپی زیاتومی را ۶۲/۵ تا ۸۲ را درصد و گروه محققان آرژانتین (۱۹۹۳) میزان آن را ۸۳ درصد برآورد نمودند^(۴,۳). ویلیامز^(۵) (۲۰۰۵) بیان می کند در ایالات متحده تا پایان دهه ۱۹۷۰ برش اپی زیاتومی تقریبا در تمام زنانی که برای بار اول زایمان می کردند، به صورت رایج انجام می شد، در حالیکه این رقم در سال ۱۹۹۷ به ۳۹ درصد رسید^(۵). گرچه هنوز بالاتر از حد مطلوب (۳۰ درصد و کمتر) می باشد^(۶)؛ اما این آمار در کشورهای مانند هند در توسعه از جمله کشورهای آسیائی مانند هند در جایگاه بالای ۹۰ درصد قرار دارد^(۷). در ایران نیز همچنان اپی زیاتومی به شکل رایج استفاده می شود، به نحوی که رضازاده و غفاری (۱۳۷۵) شیوع آن را در بیمارستان میرزا کوچک خان تهران ۸۸ درصد و عوارض ناشی از آن را ۵/۳ درصد بیان کردند^(۸).

محققان مختلف مزایای متفاوتی را برای اپی زیاتومی مطرح نموده‌اند که شامل جلوگیری از صدمات داخل جمجمه نوزاد، بهبود نمره آپگار، جلوگیری از پارگیهای نامنظم و شدید پرینه، ترمیم راحت تر برش اپی زیاتومی نسبت به پارگیها، پیشگیری از شلل‌شدن عضلات کف لگن و بروز سیستوسل^۳ و رکتوسل^۴ می باشد، اما مدرک مستدلی که این مزایا را تایید کند، وجود ندارد و نقش اپی زیاتومی فقط در مورد کاهش پارگیهای قدامی پرینه به اثبات رسیده و بقیه موارد یا اثبات نشده و یا رد شده است^(۹,۱۰). ویلیامز^(۵) (۲۰۰۵) نیز تأکید می نماید، انجام اپی زیاتومی روتینی با افزایش

1-Episiotomy

2-Shiono

3-Williams

4-Cystocele

5-Rectocele

و طی مراحل زایمانی مادر دقیقاً تحت مراقبت بوده و در صورت پیشرفت غیرطبیعی اتساع دهانه رحم یا ناکافی بودن انقباضات رحمی انفوژیون وریدی اکسی توسین شروع و حجم و میزان آن ثبت گردید. از مادر خواسته شد در شروع مرحله دوم زایمان همراه انقباضات زورهای نسبتاً کوتاه بزن، سپس زمانی که ۳-۲ سانتی‌متر از سر جنین طی یک انقباض در مدخل مهبل رویت گردید، مادر به اتفاق زایمان هدایت شد. کلیه مادران در وضعیت لیتوتومی رایج قرار گرفتند، مادرانی که در گروه ابی‌زیاتومی رایج قرار داشتند، طبق سیاست حاکم بر بیمارستان ابی‌زیاتومی شدند، در مورد مادرانی که در گروه ابی‌زیاتومی انتخابی قرار داشتند، برش ابی‌زیاتومی انجام نشد، مگر موارد لازم جهت برش مانند وضعیت پس سری خلفی، جنین درشت، زجر جنینی و مواردی مانند پرینه سفت و کوتاه که انجام ندادن ابی‌زیاتومی بوضوح منجر به پارگی شدید پرینه می‌شد، وجود داشته باشد. برش در هر دو گروه از نوع میانی کناری و به طول ۳-۴ سانتی‌متر بود.

لازم به ذکر است که همه زایمانها در دو گروه توسط پژوهشگر انجام و نحوه کنترل پرینه در دو گروه یکسان بود، پس از انجام زایمان و خروج کامل جفت و پرده‌ها، توسط کمک پژوهشگر که از گروه مادر اطلاعی نداشت، طول و عمق برش ابی‌زیاتومی با استفاده از سوآپ استریل و خطکش مدرج تعیین و ثبت شد. همچنین پرینه از لحاظ گسترش برش ابی و یا پارگی در سایر نواحی توسط وی مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که برش ابی‌زیاتومی انجام نمی‌شد، بعد از زایمان پرینه از لحاظ وجود پارگیهای قدامی و خلفی، طول و عمق و درجه پارگیها مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت وجود ابی‌زیاتومی یا پارگی پژوهشگر پرینه را ترمیم کرد. ضمناً جهت رعایت ملاحظات اخلاقی مادران تا ۲ ساعت بعد از زایمان تحت نظر بودند و کنترل شدند. آزمونهای آماری مورد استفاده در این مطالعه شامل آزمون تی، کای اسکوئر، دقیق فیشر و آزمون من ویتنی با ضریب اطمینان ۹۵ درصد بوده است.

برای کل زایمانها توصیه می‌کند و با توجه به اینکه هیچ مدرک محکم علمی در تایید ابی‌زیاتومی رایج وجود ندارد (۱۱، ۱۲). علاوه بر آن انجام روتین یا محدود ابی‌زیاتومی تفاوتی در ایجاد ترومای شدید پرینه یاوازن، مقاربت دردناک و بی اختیاری ادرار ندارد (۱۱). این اقدام باید به طور انتخابی و به موارد خاص مادری و جنینی محدود گردد (۱۲-۱۱). با عنایت به اینکه در کشور ما ابی‌زیاتومی به صورت رایج انجام می‌گیرد و تحقیقات بسیار کمی نیز جهت مقایسه ابی‌زیاتومی رایج و انتخابی انجام شده است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه خدمات پرینه در مادران نخست‌زا با ابی‌زیاتومی رایج و انتخابی انجام گرفته است.

روش کار

اپن پژوهش که از نوع کارآزمائی بالینی تصادفی می‌باشد، در فاصله تیر تا بهمن ماه سال ۱۳۸۲ در بیمارستان شهید مدرس کاشمر انجام گردید.

در این تحقیق ۱۰۰ خانم نخست‌زا که شرایط ورود به پژوهش را دارا بودند (سن بین ۳۵-۴۷ سال، سن حاملگی بین ۴۲-۳۷ هفته کامل، حاملگی تک قلو، نمایش قله سر، زایمان طبیعی، قد بالای ۱۵۰ سانتی‌متر و وزن بین ۴۵-۹۰ کیلوگرم) انتخاب، سپس به صورت تخصیص تصادفی به صورت یک در میان در فاز فعال مرحله اول زایمان در یکی از دو گروه با ابی‌زیاتومی رایج و انتخابی قرار گرفتند.

ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق شامل برگه انتخاب نمونه، برگه‌های مصاحبه و مشاهده، مقیاس سنجش قدرت عضلات کف لگن، سوآپ استریل و خطکش مدرج بودند.

در این مطالعه مادران در اتساع ۵-۳ سانتی‌متری دهانه رحم یعنی در فاز فعال مرحله اول زایمان وارد پژوهش شده، در بد و پذیرش طول میاندو راه با استفاده از سوآپ استریل و خطکش فلزی مدرج و نمره قدرت عضلات کف لگن با استفاده از مقیاس مخصوص ارزیابی قدرت عضلات کف لگن تعیین شد

نتایج

در این پژوهش دو گروه از نظر متغیر سن با میانگین $20/8$ در گروه انتخابی و $40/4$ سال در گروه رایج با یکدیگر همگن بودند ($p=0/399$), از لحاظ میزان تحصیلات و شغل مادر نیز اختلاف آماری معنی دار نداشتند ($p=0/399$ و $p=1$), همچنین دو گروه از نظر شغل و تحصیلات همسر و میزان درآمد خانواده نیز همگن بودند.

توزیع فراوانی واحدهای پژوهش از نظر مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی و نحوه انجام مراقبتهاي دوران بارداری با تست فیشر تفاوت معنی دار آماری نشان نداد ($p=0/11$ و $p=1$), به علاوه از نظر خواسته بودن حاملگی و سابقه سقط نیز بین گروههای مورد مطالعه اختلاف معنی دار آماری مشاهده نگردید ($p=0/715$ و $p=0/67$), همچنین بین دو گروه از لحاظ طول جسم پرینه (با میانگین $3/6 \pm 0/4$ سانتیمتر در گروه انتخابی و $0/6 \pm 0/6$ در گروه رایج و $p=0/179$), قوام پرینه (با میانگین 58% در گروه

انتخابی و 60% در گروه رایج با قوام متوسط و $0/144$ ($p=0$) و نمره قدرت عضلات کف لگن (با میانگین $8/4 \pm 0/9$ در گروه انتخابی و $8/6 \pm 1/2$ در گروه رایج و $4/468$ ($p=0$) اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد. طبق آزمون تی دانشجوئی دو گروه از نظر میانگین شاخص توده بدنی 24 ساعت بعد از زایمان همگن بودند ($p=0/917$), به گونه ای که میانگین BMI در گروه انتخابی $4/5 \pm 22/7$ و در گروه رایج $5/1 \pm 22/6$ کیلوگرم بر متر مکعب بوده است. به علاوه گروههای مورد مطالعه از نظر متغیرهای تحت کنترل در مراحل مختلف زایمان مانند جایگاه سرجنین و اتساع دهانه رحم در بروپذیریش، طول فاز فعال مرحله اول و دوم زایمان، حجم مایعات وریدی دریافتی، مصرف دارو و ضد درد، شدت، مدت و فاصله انقباضات رحمی، نوع، تعداد وزن زدن مادر در مرحله دوم زایمان، (جدول ۱). وزن، قد، دورسر، دور شانه نوزاد و نمرات آپگار دقایق اول و پنجم نیز اختلاف آماری معنی دار نداشتند.

جدول ۱- مقایسه میانگین متغیرهای کنترل شده در مراحل مختلف زایمان به تفکیک گروه در مطالعه بررسی میزان صدمات پرینه در مادران نخست زا با اپیزیاتومی رایج و انتخابی

متغیر	گروههای مورد مطالعه				
	نتیجه آزمونهای آماری	رایج	انتخابی	انحراف معیار \pm میانگین	تعداد
$t=1/2$					
Df=۹۸	۵۰	$45/3 \pm 10/7$	۵۰	$43 \pm 7/5$	متوسط مدت انقباضات رحمی در مرحله اول زایمان
$p=0/198$					
$t=1/3$					
Df=۹۸	۵۰	$49/2 \pm 10/3$	۵۰	$51/6 \pm 7/1$	متوسط مدت انقباضات رحمی در مرحله دوم زایمان
$P=0/179$					
$t=1$					
Df=۹۸	۵۰	$234/4 \pm 10/4/3$	۵۰	$258/2 \pm 12/5/4$	حجم مایعات وریدی دریافتی
$P=0/313$					
$t=0/4$					
Df=۹۸	۵۰	$4/0/6 \pm 9/9$	۵۰	$4/0 \pm 0/7$	متوسط تعداد زورزنهای مادرطی یک انقباض در مرحله دوم زایمان
$P=0/747$					
$T=1/1$					
DF=۹۸	۵۰	$37/2 \pm 19/5$	۵۰	$32/2 \pm 15/6$	طول فاز نهفته مرحله اول زایمان
$p=0/773$					
$T=1/7$					
Df=۹۸	۵۰	$21/8 \pm 10/1$	۵۰	$25/8 \pm 12/4$	طول فاز فعال مرحله اول زایمان
$P=0/905$					
$t=0/5$					
Df=۹۸	۵۰	$210/7 \pm 88/6$	۵۰	$219/9 \pm 81/3$	طول کل مرحله اول زایمان
$P=0/59$					
$t=0/2$					
Df=۹۸	۵۰	$58/3 \pm 22/8$	۵۰	$58/2 \pm 24/7$	طول کل مرحله دوم زایمان
$P=0/983$					

معنی دار داشتند (جدول ۲ و ۳). در گروه انتخابی ۱۲ نفر (۲۴ درصد) اپی زیاتومی شدند، ۸ نفر (۱۶ درصد) پارگی خلفی، ۷ نفر (۱۴ درصد) پارگی قدامی و ۴ نفر (۸ درصد) پارگی خلفی و قدامی پرینه داشتند که در مجموع ۳۱ نفر (۶۲ درصد) دچار صدمه به پرینه شدند. در گروه اپی زیاتومی رایج تنها در ۳۰ درصد موارد لزوم مامائی وجود داشت و اقدام به اپی زیاتومی گردید. در ۷۰ درصد نمونه ها لزوم اپی زیاتومی نداشت. علاوه بر آن ۱۲ درصد پارگی قدامی نیز داشتند که در مقایسه با پارگیهای قدامی در گروه انتخابی که ۲۶ درصد تعیین شد، کاهش داشت.

در ارتباط با مصرف اکسی توسین در هردو گروه در ۹۰٪ موارد طی مرحله اول و ۸۸٪ در گروه انتخابی در مقابل ۸۶٪ در گروه رایج در مرحله دوم زایمان از اکسی توسین استفاده نگردید ($p=0.766$)، همچنین وضعیت و جایگاه سرجین در شروع مرحله دوم زایمان در دو گروه با آزمون من ویتنی تفاوت معنی دار آماری نداشت ($p=0.150$) و ($p=0.153$).

در رابطه با اهداف اصلی پژوهش، نتایج نشان داد که دو گروه برحسب انجام اپی زیاتومی و صدمات وارد بر پرینه (اپی زیاتومی و پارگی) اختلاف آماری

جدول ۲- توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب انجام اپی زیاتومی به تفکیک گروه در ۱۰۰ بیمار در بیمارستان شهید مدرس کاشمر

کل		رایج		انتخابی		گروههای اپی زیاتومی	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	بلی	
۶۲	۶۲	۱۰۰	۵۰	۲۴	۱۲	بلی	
۲۸	۲۸	-	-	۷۶	۲۸	خیر	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۵۰	کل	

$$\text{chi - Squar : } \chi^2 = 6.0 / 2 \quad df = 1 \quad P < 0.001$$

جدول ۳- توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب صدمات وارد بر پرینه (اپی زیاتومی و پارگی) به تفکیک گروه در ۱۰۰ بیمار در بیمارستان شهید مدرس کاشمر

کل		رایج		انتخابی		گروههای مورد مطالعه	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	صدمات پرینه	
۸۱	۸۱	۱۰۰	۵۰	۶۲	۳۱	دارد	
۱۹	۱۹	-	-	۲۸	۱۹	ندارد	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۵۰	کل	

$$\text{chi - Squar : } \chi^2 = 21.1 \quad df = 1 \quad P < 0.001$$

زایمان با طول و عمق پارگیهای خلفی در گروه انتخابی با ($P < 0.001$) اختلاف آماری معنی دار داشتند، به طوری که میانگین طول صدمات خلفی پرینه در گروه رایج $10/0 \pm 3/9$ و در گروه انتخابی $2/3 \pm 0/7$ سانتیمتر و میانگین عمق صدمات خلفی پرینه در گروه رایج $0/8 \pm 0/2$ و در گروه انتخابی $0/5 \pm 0/9$ سانتی متر بوده است که نتایج حاکی از کاهش صدمات وارد بر پرینه در موارد عدم انجام اپی زیاتومی می باشد، به طوریکه در گروه انتخابی

از لحاظ درجه صدمات وارد بر خلف پرینه نیز نتایج نشان داد که ۱۰۰ درصد مادران گروه رایج پارگی درجه ۲ پرینه داشتنداما در گروه انتخابی ۱۲ نفر (۵۰ درصد) مادران پارگی درجه ۲ و ۱۲ نفر (۵۰ درصد) دچار پارگی درجه ۱ پرینه شدند که براساس آزمون کایدو از نظر درجه پارگی پرینه دو گروه دارای اختلاف آماری معنی دار بوده اند ($P < 0.001$). همچنین براساس آزمون تی دانشجوئی میانگین طول و عمق برش اپی زیاتومی در گروه رایج بعد از

کاهش داشته است (۱۱)، آندره آ و همکاران (۲۰۰۴) نیز گزارش نمودند، اپی زیاتومی نمی تواند از بی اختیاری ادراری و مقعدی و پرولاپس ژنی تال جلوگیری نماید (۱۵). به نظر می رسد اپی زیاتومی عامل اصلی ایجاد عفونت است، به علاوه فقدان لذت از فعالیت جنسی و بی اختیاری ادرار و مدفوع نیز از عوارض دیگر آن است (۱۶).

در این پژوهش در گروه انتخابی میزان انجام اپی زیاتومی ۲۴ درصد و در گروه رایج ۱۰۰ درصد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان صدمات وارد بر پرینه اعم از پارگی یا اپی زیاتومی در گروه انتخابی ۶۲ درصد و در گروه رایج ۱۰۰ درصد بوده است و ۳۸ درصد مادران گروه انتخابی بعد از زایمان پرینه سالم داشتند و دو گروه از لحاظ صدمات وارد بر پرینه با یکدیگر اختلاف آماری معنی دار داشتند ($p < 0.001$), گروه محققان آرژانتین (۱۹۹۳) نیز در مطالعه خود با عنوان اپی زیاتومی رایج در مقابل انتخابی میزان انجام اپی زیاتومی را در گروه انتخابی ۱/۳۰ درصد و در گروه رایج ۸۲/۶ درصد گزارش کردند، نتایج پژوهش آنها نشان داد اگر چه صدمات شدید پرینه در هر دو گروه نادر بود، اما در گروه انتخابی فراوانی این صدمات کمتر از گروه رایج بوده است ($2/1$ درصد در مقابل $1/5$ درصد در گروه رایج) (۳).

کبودی و کبودی (۱۳۷۵) نیز در تحقیقی مشابه میزان انجام اپی زیاتومی را در گروه انتخابی ۲ درصد و در گروه رایج ۹۷ درصد گزارش کردند و صدمات وارد بر پرینه را در گروه انتخابی ۷۴/۱ درصد و در گروه رایج $89/9$ درصد بیان نمودند که این اختلاف با ($0.001 < p$) از لحاظ آماری معنی دار بوده است (۱۸)، لذا به طورکلی فقدان شواهد مثبت از اغلب مطالعات کارآزمائیهای بالینی انجام شده (و همچنین مطالعه حاضر) از سودمند بودن اپی زیاتومی روئین حمایت نمی کند (۱۹) و با توجه به آنکه ویلیامز (۲۰۰۵) نیز بیان می نماید که در مرور دانجام برش اپیزیاتومی یا عدم انجام آن،

۱۹ نفر (۵۰ درصد) پرینه سالم، ۸ نفر (۲۱ درصد) پارگی خلفی، ۷ نفر (۱۸/۴ درصد) پارگی قدامی و ۴ نفر (۱۰/۳ درصد) پارگی قدامی و خلفی پرینه داشتند، ۱۲ نفر هم بالندیکاسیون اپی زیاتومی شدند. در این پژوهش مدت زمان ترمیم پرینه $\pm 7/3 \pm 5/9$ (۱۱/۹) در گروه انتخابی در مقابل $\pm 7/8$ در گروه رایج و $0.001 < p$ و تعداد بسته های نخ مصرفی جهت ترمیم (0.05 ± 0.01) در گروه انتخابی ± 0.03 در گروه رایج و $0.001 < p$ نیز در گروه انتخابی کمتر از گروه رایج بوده است. همچنین در دو گروه نمرات کسب شده رضایت از زایمان نیز اختلاف معنی دار آماری داشت ($0.007 < p$) و مادران گروه انتخابی رضایت بیشتری از زایمان داشتند.

بحث

کارآزمائیهای بالینی در بیمارستانهای امریکا نشان می دهد که اپی زیاتومی عامل خطر اصلی پارگیهای شدید طی زایمان می باشد که آسیبی قابل پیشگیری است و بر اساس این مطالعات میزان افتاده اپی زیاتومی 10% برابر بیشتر از موارد لازم (حد مطلوب آن 30% درصد و کمتر برآورد شده است) می باشد (۱۴، ۶). توصیه شده اپی زیاتومی محدود به موارد لزوم خاص مادری و جنینی گردد (۱۲). «سیاست اجتناب از اپی زیاتومی به صورت رایج شیوع آن را از 80% به 40% درصد و شیوع آسیبها وارد بر پرینه را از 85% به 70% درصد کاهش داده است (۸).

گروه محققان آرژانتین (۱۹۹۳) بیان کردند که سیاست اپی زیاتومی انتخابی از حدود 9000 ترمیم جراحی میاندوراه در سال جلوگیری می کند (۳). همچنین بانزال^۱ و همکاران (۱۹۹۶) در تحقیق خود با عنوان «آیا انجام اپی زیاتومی در زایمان طبیعی مفید است؟» بیان کردند به موازات کاهش استفاده از اپی زیاتومی میزان بی اختیاری مدفوع، فیستولهای رکتوواژنیال^۲ درد و مقاومت دردناک پس از زایمان

¹-Bansal

²-Recto vaginal fistula

می توان از صدمات وارد بر پرینه به میزان قابل توجهی کاست که این امر می تواند عملکرد مادران را در مراقبت از نوزاد و بقیه اعضاء خانواده افزایش داده و در نهایت موجبات ارتقاء سلامت جامعه فراهم می گردد، همچنین به علت کاهش مصرف نخ بخیه، ضد درد، مواد ضد عفونی کننده، مداخلات جراحی و ترخیص زودتر مادران از بیمارستان صرفه جوئی قابل توجهی نیز در هزینه درمان می شود.

اختلاف نظرزیاری وجود دارد، ما معتقد هستیم که در مورد برش اپی زیاتومی باید در تک تک افراد بسته به شرایط موجود تصمیم گیری کرد و نباید این کار به طور روتین انجام شود(۵).

نتیجه‌گیری

به طور کلی براساس نتایج این پژوهش با انجام اپی زیاتومی به صورت محدود و طبق اندیکاسیون

خلاصه

مقدمه: اپی زیاتومی و پارگیها صدمات شایع پرینه در زنان نخست‌زا هستند و رایج‌ترین برش جراحی در مامائی می‌باشد. هیچ مدرک محکم علمی در تایید اپی زیاتومی رایج وجود ندارد و توصیه شده است. اپی زیاتومی به صورت انتخابی و براساس موارد لزوم مادری و جنینی انجام شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان صدمات پرینه در مادران نخست‌زا با اپی زیاتومی رایج و انتخابی انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمائی بالینی تصادفی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر سال ۱۳۸۲ بر روی ۱۰۰ خانم نخست‌زای ۱۷-۲۵ ساله با شروع خودبخودی زایمان انجام شد. واحدهای پژوهش ابتدا به صورت مبتنی بر هدف انتخاب و سپس به روش تخصیص تصادفی در دو گروه با اپی زیاتومی رایج و انتخابی قرار گرفتند، همه زایمانها توسط پژوهشگر انجام گردید. اما تعیین میزان صدمات پرینه توسط کمک پژوهشگر که از گروه مادران اطلاع نداشت، صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده‌ها فرم‌های مصاحبه و مشاهده، و مقیاس سنجش قدرت عضلات کف لگن بودند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمونهای آماری تی دانشجوئی، کایدو، منویتنی و فیشر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با ضریب اطمینان ۹۵٪ صورت گرفت.

نتایج: براساس نتایج این پژوهش ۱۲ نفر (۲۴درصد) در گروه انتخابی و ۵۰ نفر (۱۰۰درصد) در گروه رایج، اپی زیاتومی شدند ($p<0.001$) . به طور کلی صدمات پرینه در گروه انتخابی ۶۲ درصد و در گروه رایج ۱۰۰ درصد بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار وجود داشت ($P<0.0001$). در این مطالعه دو گروه از نظر متغیرهای موثر بر صدمات پرینه همگن بودند.

نتیجه‌گیری: انجام اپی زیاتومی به صورت انتخابی سبب کاهش صدمات پرینه می‌شود که می‌تواند به عنوان روشی اینمن و با صرف وقت و هزینه کمتر جایگزین اپی زیاتومی رایج شود.

کلمات کلیدی: اپی زیاتومی رایج، اپی زیاتومی انتخابی، صدمات پرینه، نخست‌زا

Reference

۱. قرهخانی پروین، ساداتیان سیداصغر. تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اصول بارداری و زایمان. چاپ اول، تهران: نورداش، ۱۳۸۱، ص ۱۴۸-۱۵۰.
۲. کانینگهام اف گری و همکاران. بارداری وزایمان ویلیامز ۲۰۰۱. ترجمه‌ی قاضی جهانی، بهرام و همکاران، جلد ۱، چاپ دوم، تهران: گلبان، ۱۳۸۱.
۳. Burroughs A, Leifear G. Argentine Episiotomy trial collaborative group. Routine vs selective episiotomy: a randomized trial. *Lancet* 1993; 342: 1517-18.
۴. Goldberg J, HOITZ D, Hyslop T, Tolosa JE. Has The use of routine episiotomy decreased? Examination of episiotomy rates From 1983 to 2000. *Obstet Gynecol* 2002; 99: 395-400.
۵. گاری کانینگهام و دیگران. بارداری وزایمان ویلیامز ۲۰۰۰. ویرایش بیست و دوم ، ترجمه گروه مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. جلد اول و دوم، تهران: خسروی، ۱۳۸۴.
۶. Clemans JL, Towers GD, McClure GB, Boyle AL. Decreased Anal Sphincter Lacerations Associated With Restrictive Episiotomy In Use. *Am J obstet gynecol* 2005;192:1620-5.
۷. 7-Kropp N, Artwell T, Althabe F. Episiotomy Rate From Eleven Developing Countries . *Int J Gynecol Obstet* 2005;97:157-159.
۸. غفاری لیلا. بررسی درصد فراوانی اپیزیاتومی و عوارض ناشی از آن در بیمارستان میرزا کوچکخان تهران . پایان‌نامه، تهران : دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۵ ، ص ۲-۵.
۹. ویلسون، روبرت. مامائی و بیماریهای زنان. ترجمه داریوش. کاظمی. چاپ دوم، تهران: دانش پژوهش، ۱۳۷۶، ص ۵۷۹-۵۸۳.
10. Beisher NA, Mackay EU, colditz p. Ostetric and the newborn. 3rd ed, London: w.B. saunders;1996.456-465.
11. Scott J R,Cibbs RS, Karlan BY, Wawey AF. Danforths Obestetric & Gynecology .9th ed. Philadelphia: Williams&Wilkins lipincott ; 2003 .43-44.
12. Bansal RK, Tan WM, Eoker JL, Bishop JT, Kilpatrick SJ. Is there a benefit to episiotomy at spontaneous vaginal delivery?. *Am J obstet Cynecol* 1996; 175: 897-901.
۱۳. گلمکانی آذر. مقایسه اثر وضعیت خوابیده به پهلو بالیاتومی در مرحله دوم زایمان برای انجام اپیزیاتومی و وقوع پارگی پرینه در زنان نخست‌زا. پایان‌نامه. مشهد: دانشکده پرستاری و مامائی.
14. Edmonds DK. Dewhurst's text book of obstetrics and gynecology for post graduates. 6 th .ed, london : Blackwell science;1999 . 308-311.
15. Andrea Sartore. The Effects Of Mediolateral Episiotomy On Pelvic Floor Function After Vaginal Delivery. *Obstetrics& gynecology* 2004; 103: 669-673.
16. Sonia Maria Junqueira V. de, Olivera Elaine Cristina.Frequency & Criteria for the indication of episiotomy .*Revista da escola* 2005; 39:288-295.
17. Anne M. Weber,Leslie Meyn. Episiotomy use in united states, 1979-1997.*Obstetrics & gynecology* 2002;100:1177-1182.
۱۸. کبودی مرضیه، کبودی بیژن . مقایسه تاثیر اپیزیاتومی رایج و انتخابی بر میزان پارگی پرینه در زنان نخست‌زا. مجله بهبود، سال پنجم، ش ۱(۱۳۸۰)۸-۲۳.
19. 19-Bob stein. Procedure on women in labour adds risk study urges halt to episiotomy. www. Washington post.com/wpdyn/content/2005.